

Maurice PIC


DIVERSITÉS ENTOMOLOGIQUES VII


(26 JUIN 1950)

MOULINS

" LES IMPRIMERIES RÉUNIES " 1

15, RUE D'ENGHIEN, 15





SciELO/MZUSP

Descriptions et notes variées

Les *types* de toutes les nouveautés de ce fascicule sont dans ma collection. Il y a lieu de créer, chez les *Ptinides*, des genres nouveaux dans le groupement des anciennes espèces placées dans les *Mezium* Curt., certaines de celles-ci présentant entre elles des différences par trop prononcées.

1° Pour notiale Péring., le genre **Falsomezium** ayant les caractères principaux suivants. Thorax muni de crêtes peu élevées séparées en partie par des parties lisses et brillantes; élytres avec des rangées pileuses de longs poils dressés, ces organes très courts.

2° Pour costatum Pic, le genre **Costatomezium** ayant les caractères principaux suivants. Thorax non muni de crêtes, ayant un sillon transversal antérieur et orné de points enfoncés assez régulièrement disposés; élytres très brillants, glabres, nettement rétrécis à la base, ces organes courts.

Je dois à une communication récente de mon collègue Lepesme la connaissance et la possession d'un curieux *Ptinide*, **Stetomezium squamosum** Hinton, pouvant se placer près de *Falsomezium* Pic et offrant la caractéristique suivante. Thorax muni de crêtes peu élevées, séparées par des sillons ou impressions à fond lisse ou brillant; les élytres assez longs, avec des sillons ou des côtes, moins marqués que dans mon genre, les intervalles étant plus larges et ornés de nombreuses rangées de poils squamuleux. L'espèce est oblongue, rétrécie aux deux extrémités, convexe, densément revêtue de pubescence

jaune sur l'avant-corps, de coloration rousse, les élytres ayant des poils dressés; les cuisses sont aplaties et très pubescentes. L. 2,5 m.

Plinus Barbieri n. sp. Petit, oblong, noir, opaque, avec les élytres d'un vert métallique et brillants, tête, base du thorax, écusson et dessous densément pubescents de blanc, membres en partie pubescents de blanc. Elytres courts et larges, un peu déprimés près de la base, finement striés-ponctués avec de longs poils dressés. L. 2 m. Saigon (ex Barbier). — Peut se placer près de *annulipes* Pic, très caractérisé par sa coloration.

Nanophyes paulofasciatus n. sp. [Curcul.]. Subovalaire, brillant, à pubescence blanche non dense, en partie non régulièrement disposée, noir de poix, thorax un peu rous-sâtre et élytres avec une vague fascie jaunâtre raccourcie prémédiane, faite de macules rapprochées; base des antennes et pattes largement testacées. Massue des antennes de 3 articles; élytres courts, striés; pattes grêles, cuisses sans dent apparente. L. 1 m. environ. Tonkin. — Peut se placer près de *binhanus* Pic, moins robuste et coloration différente.

Cryptocephalus rugicollis v. n. Vaucher [Phyt.]. Robuste, noir, teinté d'olivâtre sur l'avant-corps, élytres jaunes ayant la suture et 2 fascies transversales noires, l'antérieure isolée de la suture, la postérieure l'atteignant mais les deux éloignées du bord latéral, antennes noires, à premiers articles roux. Maroc (ex Vaucher). — Voisin de *v. mekalisius* Pic, mais avec les élytres ayant une fascie raccourcie antérieure noire, au lieu de 2 macules écartées.

C. mogadoricus n. sp. Petit, étroit, brillant, noir en dessous avec les épimères jaunes, sur le dessus en partie roux, en partie jaune, avec la suture noire, les élytres à rangées de points rembrunis fins, dessinant quelques

petites lignes plus accentuées, ou se joignant en arrière, mais n'atteignant pas le sommet ; antennes noires à base claire ; pattes foncées avec les cuisses claires. Tête jaune, rougeâtre, avec un sillon médian ; thorax rougeâtre, bordé de jaune-flave avec une ligne médiane jaune peu nette, finement ponctué ; écusson noir, taché de jaune au milieu. L. 2,5 m. Mogador (ex Vaucher). — Peut se placer près de *blandulus* Har, très caractérisé par ses élytres linéolés de foncé.

Pagria Donckieri n. sp. [Phyt.]. Oblong, testacé, suture foncée, antennes foncées à l'extrémité. Thorax un peu angulé latéralement près de la base, à ponctuation diverse, petite sur le disque ; élytres un peu rétrécis sur la base, assez larges, atténués postérieurement, faiblement impressionnés vers la base, à rangées de points divers, plutôt fins. L. 2 m. Sumatra. — Diffère de *minor* Pic par le thorax moins angulé et plus nettement ponctué, les élytres moins courts.

P. diversepunctata n. sp., du Tonkin, voisin du précédent par sa coloration, en diffère par le thorax ayant une ponctuation générale plus forte et plus rapprochée sur le disque des élytres, plus larges sur la base avec les épaules plus marquées, aussi plus nettement impressionnés. L. 2,5 m.

Obrium foveipenne n. sp. [Longicorne]. Peu allongé, brillant, rouge, avec la tête noire, les membres et les élytres testacés, ces derniers avec l'apex brièvement marqué de noir. Tête, avec les yeux, plus large que le thorax, ce dernier long, sinué latéralement, plus étroit à la base qu'en avant ; élytres courts et un peu larges, marqués, derrière l'écusson, d'une assez grande impression fovéolée qui caractérise l'espèce au premier coup d'œil. L. 6 m. Célèbes.

Embrik Strandia bimaeculatum v. n. **reductum**. Elytres entièrement noirs à l'exception d'une très petite macule jaune sur chacun vers le milieu discal. Chine.

Falsodebilia subopaca n. sp. [Longicorne]. Etroit, subparallèle, opaque avec la tête seulement un peu brillante, noir avec les pattes teintées de roussâtre par places, thorax avec une bordure basale et une bande antémédiane, réunies latéralement, faites de pubescence blanche, côtés du dessous du corps en partie revêtu de pubescence analogue, l'écusson blanc. L. 7 m. Tonkin. — Caractérisé par son aspect mat et les dessins blancs argentés particuliers.

Perissus latepubens n. sp. Allongé, subparallèle, noir, revêtu d'une pubescence grise à peu près continue laissant, sur chaque élytre, 2 macules basales et une discale postmédiane noires, ces organes ayant, en surplus, un demi-cercle prescutellaire jaune; antennes au sommet et pattes rousses. L. 13 m. Chine. — Espèce à dessins élytraux qui la distinguent à première vue.

Plagionotus detritus v. n. **Theresæ** [Longicorne]. Elytres foncés, à base peu largement et bordure latérale rousses, avec les fascies postérieures jaunes réunies sur la suture, de plus, l'anteapicale est courte près d'une macule externe sur chaque étui. Les Guerreaux (Pic).

Momisofalsus n. g. [Longicorne]. Par ses yeux largement divisés rentre dans les *Tetraopini*, en se rapprochant de *Momisis* Pasc.; très caractérisé par la structure des antennes qui sont excessivement longues, grêles, et ciliées en dessous, le scape atteint la base du thorax mais est plus court que le 3^e article des antennes, articles 3 et suivants tous très longs, le dernier terminé par un appendice recourbé. Tête un peu plus large que le thorax, tubercules des antennes non pointus; thorax un peu robuste, non transversal, sinué latéralement et postérieurement avec un rebord basal net; élytres courts; pattes courtes et robustes. Genre établi pour l'espèce nouvelle suivante procurée par J. Clermont.

M. Clermonti n. sp. Un peu allongé, brillant, orné de poils hirsutes, roux avec les antennes et les élytres noirs,

ces derniers ayant de vagues et étroites fascies postérieures rougeâtres. Tête un peu creusée entre les antennes, à ponctuation espacée mais non aussi forte que celle du thorax; élytres à ponctuation irrégulière plutôt écartée, diversement fine, un peu atténués et subtronqués au sommet, sans épine. L. 10 m. Tonkin.

Semianus atrimembris n. sp. [Rhipiceride]. Allongé, subopaque, noir membres compris avec le dessus du corps orangé-rougeâtre. Antennes longuement flabellées. Tête et thorax finement et densément ponctués, ce dernier assez court, retréci en avant, à angles postérieurs sail-lants, sans sillon médian, avec des impressions postérieures. Elytres pas plus larges que le thorax, longs, un peu atténués au sommet, finement et densément ponctués, avec de petites costules discales écartées. L. 13 m. Indes Or. — Voisin de *brevior* Pic, coloration analogue, mais forme plus allongée, thorax sans trace de sillon, sculpture des élytres plus fine avec les côtes moins marquées.

Callirhipis Laportei v. n. **nigroimpressus**. Noir, roux-orangé en dessus avec la tête maculée de noir sur le vertex, 2 fossettes foncées au thorax, écusson et bande suturale triangulaire, prolongée sur la base des élytres, noirs. Chiriqui.

Carphurus bicoloripennis n. sp. [Malachide]. Petit, allongé, éparsément pubescent, finement ponctué, brillant, noir. élytres d'un roux brunâtre avec la base noire, antennes testacées, un peu rembrunies au sommet, celles-ci filiformes. Thorax court, à dépression transversale postérieure nette, peu ponctué; élytres peu longs, faiblement élargis postérieurement, à ponctuation espacée en partie un peu forte. L. 3 m. Nouvelle-Guinée. — Caractérisé par les élytres de 2 couleurs tranchées; peut se placer près de *nigrinus* Gorh.

C. palawanus n. sp. Petit et étroit, peu pubescent de gris, brillant, finement ponctué, noir, tête roussâtre-tes-

tacée ainsi que les premiers articles des antennes et les 4 pattes antérieures ; élytres largement blancs sur leur milieu. Thorax assez court, un peu rétréci postérieurement, à impressions transversales antérieure et postérieure ; élytres pas très longs, subparallèles. L. 3 m. Palawan. — Voisin de *semiflavus* Pic, en diffère par la tête rousse, les pattes postérieures plus foncées.

C. robusticornis n. sp. Assez grand, oblong-allongé, brillant, testacé, antennes, sauf la base, tibias et tarses noirs de poix, élytres foncés métalliques, légèrement teintés de cuivreux, antennes bicolores, robustes ; thorax plus long que large, rétréci aux deux extrémités, à ponctuation indistincte, sans impression nette ; écusson clair ; élytres un peu longs, nettement élargis à l'extrémité, à ponctuation assez forte et écartée, presque nulle au sommet. L. 4 m. Tonkin. — Voisin de *tonkineus* Pic, coloration différente.

C. vitticollis n. sp. Grand, allongé, en majeure partie noir, devant de la tête, base des antennes, thorax (moins une bande discale large foncée), cuisses antérieures, base des tibias et tarses antérieures, partie de l'abdomen en dessus testacés ou roussâtres ; antennes très longues et robustes ; thorax pas plus long que large, nettement impressionné et relevé sur la base, celle-ci étroitement roussâtre ; élytres longs, faiblement élargis au sommet, à ponctuation assez fine, diversement, mais médiocrement espacée. L. 3,5 m. Tonkin. Espèce caractérisée par la présence d'une bande thoracique foncée.

Carphuroides kudatensis n. sp. Oblong-allongé, éparsément mais nettement pubescent de gris, finement ponctué, brillant, noir à reflets un peu bleutés en dessus, base des antennes largement, tibias antérieurs, genoux au moins aux pattes intermédiaires, testacés. Antennes assez robustes, subfiliformes. Thorax assez court, arqué


sur les côtés sans, ou à faible, dépression postérieure ; élytres un peu élargis en arrière, finement ponctués. L. 3, 3,5 m. Bornéo : Kudat. — Peut se placer près de *tibialis* Pie, coloration moins noire, antennes plus largement testacées.

Beudoclerops mutillarius* v. *n. alboapicalis [Cleride]. La fascie postérieure blanche agrandie s'étend sur l'extrémité des élytres. Les Guerreaux (Pie).

***Eburiphora Theresæ* n. sp.** [Cleride]. Étroit et allongé, peu brillant, vert en dessous, bleu en dessus avec les élytres ornés chacun, avant et après le milieu, d'une petite goutte blanche, l'antérieure étant un peu en dedans, membres testacés avec l'arête des tibias brunâtre. Thorax peu robuste, densément ponctué au milieu, éparsément en avant ; élytres à rangées nettes de points qui sont en partie embrouillés vers le milieu et ornés au sommet de petits tubercules non serrés. L. 8 m. Madagascar. — Se rapproche de 4 *bullata* Frm. mais la sculpture est autre et les pattes sont plus claires.

***E. atrolineata* v. *n. juncta*.** Sur les élytres, la ligne longitudinale noire se joint, en avant, à la courte ligne post-scutellaire noire.

***Platynoptera peruviana* n. sp.** [Cleride]. Grand, très élargi postérieurement, noir, côtés du thorax orangés. élytres rouges à la base, avec une macule préscutellaire triangulaire foncée, prolongée étroitement sur la suture, postérieurement largement d'un vert métallique, 4-costés ; antennes larges, aplaties, les deux avant-derniers articles étant assez longs, munis à la base d'un appendice un peu coudé et de forme pectinée-large, dernier plus long, assez épais, échancré sur le côté antérieur. L. 16 m. Pérou. — Voisin de *lyeoides* Spin., caractérisé par ses élytres très élargis en arrière, verts au sommet et foncés en avant sur la suture.



P. tucumanensis v. n. breveapicalis. Elytres longs, orangés, brièvement marqués de foncé au sommet, thorax orangé avec deux longues bandes noires. Rép. Argentine.

Theresamora n. gen. [Cleride]. Yeux finement facétés ; corps allongé, assez étroit ; thorax long, rétréci en arrière, faiblement étranglé près du sommet avec un pli latéral net, rebordé sur la base ; antennes épaisses et longues, à articles 3 à 7 larges, courts et très poilus, 8^e petit, 9^e très long et simple, 2 derniers longs. Elytres costés et rebordés sur les côtés. — Genre voisin de *Platynoptera*, établi pour l'espèce nouvelle suivante.

T. gratiosa n. sp. Allongé, étroit, très faiblement élargi postérieurement, pubescent de gris, un peu hirsute, noir, pattes en partie rousses ; tête jaune en avant, noire en arrière avec une bande frontale jaune ; thorax jaune, largement noir sur le milieu du disque, sauf antérieurement. Elytres presque mats avec la base peu brillante, noirs, ornés sur chacun d'une ligne humérale peu longue, atténuée postérieurement et d'une fascie postmédiane sinuée n'atteignant pas la suture, de coloration jaune. L. 10 m. Amazones.

Pyticera reducta n. sp. [Cleride]. Allongé, atténué aux deux extrémités, faiblement élargi postérieurement, noir, thorax jaune sur son milieu et ses côtés antérieurs, écusson jaune, élytres noirs, vers leur milieu et près de la suture courtement marqués de jaune, à rebord antérieur étroitement et plus ou moins longuement jaunes. Antennes larges avec les 3 derniers articles diversement longs ; thorax peu long, rétréci un peu en arrière et davantage en avant ; élytres densément ponctués, sans côtes. L. 8-9 m. Amazones. — Peut se placer près de *humeralis* Horn, sa coloration est différente.

P. flavicollis v. n. immarginata. Noir, avec partie de la tête, thorax et écusson flaves. Brésil. — La forme typique a la tête entièrement flave et les élytres bordés de pâle.

Graptoclerus trinotatus n. sp. [Cleride]. Oblong, brillant, noir avec l'avant-corps rouge, tête un peu rembrunie au vertex, élytres noirs, ornés chacun des dessins flaves suivants : fascie prébasale raccourcie, un peu oblique, fascie médiane étroite, circonflexe, atteignant la suture, macule arrondie près du sommet ; antennes et pattes antérieures rousses, les autres plutôt foncées. L. 8 m. Afrique Australe. — A placer près de *signatus* Gorh, qui n'a sur les élytres que deux bandes claires.

Priocera Theresæ n. sp. [Cleride]. Allongé, brillant, roux, thorax sur la base et élytres par places un peu rembrunis, ceux-ci ornés chacun de 4 signes flaves qui sont : une macule discale basale oblique, une fascie externe antémédiane arquée, une macule transversale présuturale en dessous du milieu, une grande macule antepicale. Thorax long, inégal ; élytres un peu creusés au milieu, en partie fortement ponctués en rangées. L. 5,5 m. Amazones. — Espèce très caractérisée par ses dessins élytraux quadruples et superposés.

P. variesignata n. sp. Allongé, brillant, avant-corps noir avec la base du thorax rousse, élytres roux, ayant chacun les dessins jaunes, ou noirs, suivants : une macule basale jaune, une macule transversale prémédiane externe entourée de noir, une macule médiane discale jaune, une fascie oblique antepicale noire avec son voisinage plus pâle que le fond des élytres ; pattes en partie rembrunis. L. 4-4,5 m. Amazones. — Espèce à dessins des élytres spéciaux, pouvant se placer près de *minuta* Ths.

P. tarapotensis mihi, forme du précédent et sculpture analogue avec une couleur identique sur l'avant-corps, mais ayant les pattes plus foncées, les élytres noirs sur la base, jaunes et roux postérieurement, ayant chacun les signes flaves suivants : un trait discal basal raccourci oblique, une grande macule prémédiane externe oblique,

une fascie postmédiane oblique, très large sur les côtés, sous forme de petit trait surélevé intérieurement sans atteindre la suture, apex largement flave. L. 5,5 m. Amazone.

Axina apicalis n. sp. Allongé, brillant, orangé, tête, entre les yeux, antennes (moins le 1^{er} article clair), tibias et tarses noirs, élytres à sommet d'un noir métallique. Thorax inégal en dessus, peu long et assez large; élytres finement ponctués postérieurement et en avant avec de gros points espacés en partie en rangées. L. 15 m. Brésil. — Très distinct dans le genre par sa coloration élytrale spéciale.

Tenerus adonis n. sp. [Cleride]. Etroit, brillant, rouge avec la poitrine et les membres noirs, les élytres et le sommet de l'abdomen bleus métalliques, élytres bordés de clair au sommet et ornés d'une bande transversale anteapicale de pubescence argentée. Thorax robuste, élytres peu longs, longuement dépassés par l'abdomen. L. 9 m. Australie. — Jolie espèce, d'une coloration élytrale particulière avec un long abdomen bicolor.

Tenerus Clermonti. Allongé, brillant, noir avec les élytres et le thorax rouges, ce dernier marqué de noir sur son milieu antérieur, revêtu d'une pubescence jaune non serrée. Antennes robustes, à articles larges, en partie et diversement pectinés. Thorax court et large, à ponctuation assez fine, écartée; élytres longs, sans côtes, à ponctuation fine et dense. L. 8-12 m. Tonkin (coll. Pic et Clermont). — Ressemble à *superbus* Pic, mais thorax plus court, autrement marqué de noir, élytres non costés et moins densément pubescents.

Micropellocotomoides fulvus n. sp. ♂ [Hétéromère]. Oblong-allongé, brillant, finement et densément ponctué, à pubescence soyeuse d'un jaune doré, coloration d'un roux fauve. Antennes flabellées, rousses avec les fla-

belles rembrunies. L. 5,5 m. Tonkin. — A placer près de *major* Pic, dont la coloration est tout autre.


M. laosensis mihi, du Laos, voisin du précédent, mais plus foncé, est noir avec les élytres teintés de brun et orné d'une pubescence plutôt grisâtre. L. 5 m.

Lagriomima n. g. [Hétéromère]. Voisin de *Pseudolagria* Lap., mais tête plus transversale, thorax court et large muni d'un fin sillon transversal près de la base, sans impressions discales, mais avec d'autres postérieures externes transversales; élytres larges ayant une impression antérieure, discale prolongée sur chacun en stric discale et pubescente. — Genre établi pour l'espèce qui suit.

Lagriomima albolineata n. sp. Oblong, brillant, à longue pubescence blanche en partie hirsute, formant, sur chaque élytre, une bande discale longitudinale étroite, noir, avec l'avant-corps et l'écusson d'une testacé rougeâtre; antennes noires à base rousse, non absolument filiformes mais assez grêles et pas très longues; pattes grêles, foncées, en partie teintées de roussâtre. L. 7 m. Tonkin.

Macrosiagon natalense n. sp. ♂ [Hétér.]. Un peu robuste, assez court, peu brillant, noir, bord du thorax en partie, sommet de l'abdomen et pattes en partie rouges, antennes noires, à base testacée, flabellées. Elytres assez larges et courts, très déhiscent et pointus au sommet, jaunes, avec une macule préapicale externe noire, à bordure basale externe noire, sommet rougeâtre. L. 5 m. Natal. — Diffère de *caffrum* Führ (ex descript.) par les élytres sans macule discale noire, le thorax, à bordure rouge postérieure, à lobe un peu relevé.

M. lateapicale n. sp. ♀. Un peu robuste, peu allongé, brillant, rouge, côtés de la poitrine, sommet des élytres largement et genoux noirs, antennes claires, un peu rembrunies au sommet, longuement pectinées; vertex de la



tête au sommet subtronqué ; lobe médian du thorax fortement surélevé et denté postérieurement, assez infléchi en avant ; élytres jaunes à sommet largement noir. L. 8 m. Djibouti. — Peut se placer près de *Ricli* Pic, très caractérisé par sa coloration, le lobe du thorax fortement denté.

M. gabonicum n. sp. ♂. Un peu allongé et non étroit, noir avec les antennes testacées, flabellées, les élytres jaunes, à extrême base bordée de noir et sommet noir. Thorax à lobe médian déclive, subtriangulaire. L. 8 m. Gabon. — Plus robuste que *natalcusc* mihi dont il mime la coloration élytrale avec le thorax tout noir à lobe différent.

M. Corporaali n. sp. ♂. Petit, étroit, brillant, noir avec seulement la base des antennes et l'abdomen teintés de jaune ; antennes longuement flabellées, les rameaux étant un peu arqués. Tête très brillante subarquée sur le vertex, finement ponctuée ; thorax long, à lobe triangulaire déprimé, à ponctuation nette, un peu écartée ; élytres pas très longs, longuement déhiscent, peu impressionnés, à ponctuation écartée. L. 4 m. Sumatra (ex Corporaal). — A placer près de *atriceps* Pic, élytres moins longs, plus déhiscent, thorax noir, etc...

Discodon atrobasale n. sp. [Malac.]. Allongé, subparallèle, testacé-roux avec les élytres orangés, courtement bordés de noir à la base, partie postérieure de la tête et membres noirs. Thorax court et large, sans échancrure latérale marquée, ayant des parties saillantes sur le disque. L. 10 m. Bolivie. — Espèce surtout caractérisée par l'étroite bordure noire de la base des élytres.

D. insignatum n. sp. Allongé, non étroit, testacé, tête, sauf partie buccale, antennes, sommet des cuisses, tibias et tarses noirs. Thorax court et large, arqué en avant, subsinué sur les côtés, sans échancrure marquée. L. 8 m.

Brésil. — Voisin de *atriceps* Pic, avec une autre coloration des pattes.

D. grossoanum n. sp. Allongé, brillant, testacé-flave avec la tête foncée postérieurement, les élytres brièvement rembrunis sur la base vers les épaules, les antennes foncées à base claire. Thorax large, subsinué latéralement, sans échancrure nette. L. 8 m. Brésil. — Plus pâle que le précédent, ayant les pattes entièrement claires et les élytres brièvement rembrunis près des épaules.

D. hansanense n. sp. Allongé, assez robuste, brillant, noir, côtés du thorax orangés, élytres avec une macule humérale allongée, et une fascie transversale prémédiane sinuée orangés; antennes un peu aplaties vers la base avec plusieurs articles impressionnés en dessus. Thorax court et large, faiblement incisé vers le milieu des côtés; élytres sur chacun avec 2 côtes discales bien marquées, en partie granulés. L. 8-9 m. Brésil. — A placer près de *criolanum* Pic, forme moins robuste, coloration des élytres différente.

D. nigroscapulare, n. sp., de Bolivie, de coloration analogue au précédent, mais avec les côtés du thorax moins largement clairs, sans échancrure latérale marquée, les élytres à dessins noirs antérieurs réduits à une grande macule préscutellaire et les élytres, en surplus, bordés de noir sur les côtés et sur toute leur longueur. L. 9 m.

D. brevenotaticolle n. sp. Peu allongé et assez robuste, un peu brillant sur l'avant-corps, subopaque sur les élytres, noir, parties buccales et dessous des yeux, sur la tête flaves, thorax marqué d'orangé sur chacun de ses côtés postérieurs, élytres ayant sur chacun une macule humérale orangée isolée des bords, étroite en avant, large en arrière, avec, au delà du milieu, un étroit prolongement externe. L. 9 m. Tucuman. — Distinct du précédent par la coloration claire du thorax réduite, les élytres plus largement noirs.

D. Breuningi n. sp. ♂. Grand, allongé, subparallèle. roux avec les élytres plus pâles, antennes rousses avec les premiers articles tachés de brun, filiformes. Thorax assez court, un peu large, subarqué en avant, à faible échancrure latérale presque médiane; élytres longs subparallèles, finement ponctués antérieurement, plutôt granulés vers l'extrémité. L. 11 m. Pérou. — Diffère de *grande* Pic par le thorax plus court, les antennes non entièrement foncées à la base.

D. incertum n. sp. (1) ♀. Allongé et un peu robuste, peu brillant, roux-testacé, tête maculée de foncé en dedans de chaque œil, antennes, sommet des cuisses, tibias et tarses noirs. Thorax court et large, subsinué sur les côtés; élytres longs, parallèles. L. 9 m. Amérique Méridionale. — A placer près de *Reitteri* Pic.

D. hattesense v. n. *annulimembris*. Large et un peu allongé, roux, antennes noires annelées de clair, pattes testacées, sommet des cuisses, des tibias et tarses noirs; thorax court, transversal, faiblement échancré sur les côtés en dessous du milieu. L. 8 m. Guyane.

D. basicurvatum n. sp. Allongé, brillant, un peu robuste, testacé avec la tête rembrunie au milieu, les élytres à sommet noirs avec, sur chacun, une bande discale foncée qui se recourbe en dedans sur la base, puis s'élargit sur les épaules. Antennes assez grêles, foncées, à articles brièvement marqués de clair. Avant-corps robuste, thorax court et large, faiblement entaillé sur son milieu; élytres peu plus larges que le thorax, faiblement élargis sur leur milieu; pattes testacées avec les tarses en partie noirs. L. 9 m. Brésil. — Voisin de *basipenne* Pic avec une coloration particulière.

(1) Dans les *Discodon* Gorb, il est des formes non inscrites sur mon Col. Catalogus, peut-être déjà publiées; mieux vaut qu'elles soient deux fois éditées que pas du tout.

Le *venezuelense*, du Vénézuéla, voisin du précédent, a les élytres seulement marqués de foncé sur la base vers les épaules en étant presque entièrement testacé ; les antennes sont noires avec la base testacée, les pattes ont les genoux et les tarses noirs avec les tibias parfois en partie rembrunis. L. 10 m.

D. albocincticolle mihi, de Costa-Rica, est étroit et allongé, très brillant, noir avec seulement le pourtour du thorax, les côtés et l'apex des élytres bordés de blanc. Thorax assez long, atténué en avant, échancré légèrement au milieu des côtés. Antennes grêles. L. 9 m. — Peut se placer près de *antonioi* Pic.

D. variable n. sp. Allongé, subparallèle, peu brillant, noir, membres plus ou moins foncés, avec le thorax et les élytres variant de couleur mais avec leur sommet toujours entièrement foncé. A distinguer les principales modifications suivantes : élytres, en outre des côtés blancs, à suture plus ou moins claire avec le thorax clair sur les côtés (*forme typique*), ou thorax testacé (*v. Françoisi*). Elytres seulement bordés de flave latéralement avec le thorax soit flave sur les côtés (*v. Micheli*), soit clair et seulement un peu roux-brunâtre au milieu (*v. Bernardi*). Parfois élytres non bordés de clair, foncés à épaules vaguement flaves (*v. Claudii*). Tête peu marquée de clair en avant près des antennes. Thorax peu large et faiblement foncé au milieu ♂, plus large et simple ♀ ; antennes assez grêles et subfiliformes. L. 6-8 m. Brésil. — Voisin du précédent, moins allongé, moins brillant.

D. reductecinctum mihi. Allongé, brillant, jaune-flave, tête marquée de foncé entre les yeux ; élytres étroitement bordés de noir sur leur pourtour ; membres noirs avec les cuisses largement flaves à la base. L. 12 m. Pérou. — Voisin de *flavipenne* Pic.

D. antioquianum mihi. Allongé et un peu robuste, brillant, testacé-jaunâtre, chaque élytre ayant une bande

discale d'un noir de poix entière, recourbée et étroite sur la base, sommet latéral et apical, en surplus, bordé de noir. L. 12 m. Colombie. — Voisin de *univittatum* Pic.


D. Wittmeri v. n. *paulonotaticeps*. Tête brièvement marquée de noir sur le vertex (entièrement claire chez forme typique) avec les antennes noires, sauf les 2 premiers et 9 à 10 articles diversement testacés. Bolivie.

D. Bonninghauseni n. sp. ♂. Allongé, subparallèle, brillant, testacé, tête, antennes (à premiers articles roux en dessous), élytres, tibias et tarses noirs. Antennes grêles. Thorax assez large, faiblement entaillé près de la base. L. 9 m. Brésil. — A placer près de *flaviventris* Bl.

D. Lacroixi n. sp. Grand et allongé, peu brillant, orangé, membres compris. tarses antérieurs en partie noirs, élytres noirs. Antennes grêles; thorax court et large; élytres longs, peu étroits, ruguleux. L. 12 m. Bogota. — Voisin du précédent.

D. obscuriventris mihi. Dessous largement foncé, devant de la tête, thorax, écusson et pattes testacés, antennes noires, à premiers articles testacés en dessous; élytres noirs; pattes testacées. L. 8 m. Brésil. — Tout à fait voisin de *flaviventris* Bl. mais dessous du corps largement foncé, tête bicolore, élytres nettement pubescents de gris.

D. Steinbachi n. sp. ♀. Allongé, subparallèle, brillant, noir, avant-corps, écusson, base et sommet des antennes, cuisses et base des tibias testacés, élytres d'un noir bleuté. Antennes assez grêles. Thorax court et large, à peine entaillé en dessous du milieu; élytres élargis après le milieu, en partie ruguleux. L. 10 m. Bolivie. — Par la coloration des antennes se rapproche de *huellaganum* Pic, forme plus étroite, aspect moins brillant et élytres nettement ruguleux.



SciELO/MZUSP